

Une **étude de suivi floristique** a été menée au printemps 2026 sur 25 couverts, implantés par des agriculteurs avec le soutien de la Métropole de Lyon. Cette plaquette synthétise les **principaux résultats** de ces suivis.

Évolution des couverts au printemps

Couverture du sol
Diversité florale
Recouvrement par le mélange semé

Augmentation d'avril à juin



Bonne installation de la végétation, dont les espèces du mélange

Attractivité pour la faune



Indice d'attractivité pollinisateurs (PFI)

Score avifaune



Bonne attractivité moyenne

Beaucoup de variation entre les couverts



Le mélange semé contribue à améliorer l'attractivité des couverts pour les pollinisateurs

Les couverts ont toujours un intérêt pour un groupe faunistique ou un autre

=> C'est la mosaïque des milieux qui favorise la biodiversité



Piste : Travailler sur des couverts à visée de lutte biologique contre certains ravageurs

Performance du mélange



Dans les couverts les plus denses, les Graminées spontanées prennent le dessus



Proportion des Graminées dans le mélange à diminuer

- Toutes les espèces du mélange ont été observées



- Le Mélilot et le trèfle des prés sont fréquents et recouvrent bien

- La Chicorée sauvage et la Vesce cultivée sont peu présentes



→ Composition du mélange à adapter à l'avenir



Hétérogénéité des résultats



Forte hétérogénéité d'expression du mélange entre les sites implantés



Plus de diversité florale observée dans les Monts d'Or et le Franc Lyonnais



Facteurs explicatifs : types de sol, pratiques, historique parcelle...




Piste : Adapter le mélange selon les sols




Des couverts aux intérêts variables pour la biodiversité

Illustration de 3 cas rencontrés dans le suivi réalisé

Mélange quasi-absent



Mélange peu exprimé



Mélange bien exprimé



Type de couvert vers lequel tendre



Pour en savoir plus sur les couverts pour la biodiversité